




Tauchunfall-Massnahmen-Schema



DIVERS ALERT NETWORK

DAN[®] EUROPE

piano d'azione per urgenza in immersione

Respirazione subacquea?

NO

=>

Non incidente da autorespiratore

Recarsi al più vicino ospedale

Sintomi lievi?
(stanchezza insolita, prurito)

SI

=>

1. Ossigeno 100%
2. Posizione orizzontale
3. Dare acqua (1 litro ca.)
4. Osservare + esame neurologico rapido 5 minuti

NO

Sintomi gravi:
dolori, problemi cutanei, debolezza insolita, intorpidimenti, formicolii, difficoltà respiratoria, problemi vista - udito - parola, vertigini, nausea, paralisi, disturbi della coscienza, coma.
Ricorda: ogni sintomo in profondità è sempre serio.

NO

Trattare come sintomi gravi.

Consultare medico subacqueo. Osservare 24 ore.

Sollievo completo in 30 minuti?

- PRIMO INTERVENTO**
1. Rianimazione Cardio Polmonare (RCP) se necessaria
 2. Mantenere vie aeree aperte
 3. Porre il sub in posizione orizzontale
 4. Dare ossigeno 100% con maschera oronasale per il maggior tempo possibile
 5. Proteggere il sub da freddo o caldo eccessivi
 6. Se il sub è cosciente e capace di bere autonomamente, dare acqua (1 litro ca.)
 7. Se c'è un medico: Ringer lattato, fisiologica, glucosata 5% in fisiologica EV (non glucosata 5% in acqua)
 8. Consultare DAN Europe
 9. Programmare trasferimento al centro iperbarico
 10. Se necessario trasporto aereo, massima pressurizzazione possibile in cabina

DAN EUROPE CENTRAL HOTLINE ZURICH 0041.1.383.1111